

# RAR VULLEN

## LËTZEBUERG

### **Neimäerder**

D'Populatioun vum Groussen Neimäerder (*Lanius excubitor*) ass vun 100 Revéieren am Joer 2006 op just nach 6 am Joer 2018 gefall.

### **Bëschhong (*Bonasa bonasia*)**

D'Bëschhong, dat a Bëscher mat vill Ënnerholz wunnt, ass an der Groussregioun vum Ausstierwe bedrot.

### **Brongbrëschtchen (*Saxicola rubetra*)**

De leschte Beweis, datt d'Brongbrëschtchen, en typesche Bewunner vu fiichte Wisen, zu Lëtzebuerg gebréit huet, staamt aus dem Joer 2002.

### **Broochschësser (*Oenanthe oenanthe*)**

Zu Lëtzebuerg ass de Broochschësser, deen op vegetatiounsarme Fläche wunnt, vum Ausstierwe bedrot.

### **Piwitsch (*Vanellus vanellus*)**

De Piwitsch britt normalerweis op fiichte Wisen an ass zu Lëtzebuerg vum Ausstierwe bedrot.

# RAR VULLEN

## WELTWÄIT

### **Sibiresche Broochvull (Numenius tenuirostris)**

Zanter e puer Joer ginn et keng Beobachtunge vum Sibiresche Broochvull méi, esou datt dës Vullenaart méiglecherweis ausgestuerwen ass.

### **Kakapo (Strigops habroptila)**

Am Joer 2018 hu just nach 149 Kakapoen op dräi klengen Insele virun Neuseeland gelieft.

### **Bali-Spréif (Leucopsar rothschildi)**

Fréier goufe Bali-Spréiwe gefaangen, fir a Käfeger gehalen ze ginn. Aus dësem Grond ass dës Aart vum Ausstierwe bedrot.

### **Gielbroscht Mësch (Emberiza aureola)**

D'Populatiounen vun der Gielbroscht Mësch ass an de leschte Joren zesummegebrach, well dës Vullenaart an hiren Iwwerwinterungsgebitt (China) giess gëtt.

### **Glatzen Ibis (Geronticus eremita)**

De Moment gëtt et just nach eng kleng Populatioun a Marokko. An Däitschland an Éisträich gi Glatzen Ibisse geziicht an der Hoffnung, datt si sech nees hei usidelen.